



# MITOS E VERDADES SOBRE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

AGOSTO | 2025

INSTITUTO  
**LOCOMOTIVA**

**TINO**  
COMUNICAÇÃO

 **eva**

Grupo Brasileiro  
de Tumores  
Ginecológicos

# METODOLOGIA E AMOSTRA

Mapear o nível de conhecimento das brasileiras sobre o câncer de colo do útero, além de avaliar a adesão e o conhecimento em relação a práticas preventivas, com foco na vacinação contra o HPV.

## METODOLOGIA



Pesquisa quantitativa  
digital de  
autopreenchimento

## AMOSTRA



**831**

entrevistas, sendo 412  
entrevistas nas classes AB  
e 419 nas classes CD

## ABRANGÊNCIA



**Nacional**

## PERFIL



Mulheres

18 a 45 anos das  
classes ABCD


**Margem de erro**

**3,5 p.p**

**Data de campo**

30 de julho a  
12 de agosto de 2025

\*Recorte para Mães de filhos 9-17 anos: 58%




---

## A VACINA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DO HPV




**A VACINA CONTRA HPV  
AINDA NÃO  
CHEGA A TODAS AS MULHERES**



# 42%


das mulheres de 18 a 45 anos afirmam que

**não tomaram ou não  
se lembram se  
tomaram a dose de  
vacina HPV**



F10. (TODOS) Com relação aos cursos de graduação, quanto você diria que concorda com as seguintes afirmações? (RU POR LINHA)  
Base: 1150 casos

O ENTENDIMENTO DE QUE  
**NÃO HÁ INDICAÇÃO DESSA**  
**FORMA DE PREVENÇÃO**  
PARA ELAS É O PRINCIPAL  
MOTIVO PARA AS  
MULHERES **NÃO TEREM**  
**TOMADO** A VACINA DE  
HPV.



## % MOTIVOS QUE FIZERAM COM QUE NÃO TOMASSE A VACINA DE HPV (ENTRE AS 26% QUE NÃO TOMARAM VACINA CONTRA HPV)

**58%**

Não é para minha idade

**41%**

Custo para ter acesso à vacina

**29%**

Não conheço / não sabia da vacina

**26%**

Falta de tempo

**25%**

Acho que a vacina só é indicada para quem tem mais parceiros sexuais

**25%**

Não acho necessário depois que já tive a 1ª relação sexual

**21%**

Não acho necessário, pois estou em um relacionamento estável

**20%**

Medo de efeitos colaterais

**16%**


Não acho que seja eficaz

**76% PERCEPÇÕES LIMITADAS**

**55% BARREIRAS PRÁTICAS**

**29% FALTA DE INFORMAÇÃO**

**28% RESISTÊNCIA OU MEDO**



APENAS

38%


declaram conhecer muito bem  
a vacina de HPV

Base: 831 casos

C05. Em uma escala de 1 a 5, como você considera seu nível de informação sobre a vacina contra HPV? (RU)

C4. Considerando uma escala de 0 a 10, em que 0 significa nada importante e 10 muito importante, o quanto você diria que é importante tomar a vacina contra HPV? (RU POR LINHA)

AS MULHERES CONSEGUEM  
DISTINGUIR ALGUNS MITOS E  
VERDADES SOBRE O HPV,  
MAS AINDA CONVIVEM  
COM **GRANDES LACUNAS**  
**DE INCERTEZA SOBRE A**  
**DOENÇA.**



# ÍNDICE DE CONHECIMENTO SOBRE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E HPV


Atribuímos 1 ponto para cada resposta correta

VERDADE		
	Cerca de 99% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV	1 ponto
	Mesmo quem usa preservativo durante as relações sexuais não está completamente protegido contra HPV	1 ponto
	Homens também podem se vacinar contra HPV	1 ponto
	Exames como o Papanicolau são importantes para detectar alterações precoces e prevenir do câncer de colo do útero	1 ponto
MITO		
	HPV é uma doença que só atinge quem tem mais de um parceiro sexual	1 ponto
	Não dá para se prevenir contra câncer	1 ponto
	HPV só afeta mulheres, os homens apenas transmitem o vírus	1 ponto
	Se eu tiver HPV, vou perceber logo	1 ponto
	HPV não tem cura	1 ponto
	A vacina contra HPV é perigosa	1 ponto

A maior parte dessas mulheres tem um **nível médio de conhecimento** acerca das informações sobre o tratamento e prevenção do câncer de colo de útero.

## (%) NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE AS “VERDADES X MITOS”

(Escala de 0 a 10)



Base: 831 casos

C8. Classifique as frases seguintes em “verdade” ou “mito”: (RU POR LINHA)

# AINDA EXISTEM MUITAS INCERTEZAS SOBRE O CÂNCER DE COLO DO ÚTERO: 6 EM CADA 10 MULHERES TÊM DÚVIDAS SOBRE O PERIGO DO HPV



57%

não sabem que cerca de 99% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV

# 3 em cada 10


mulheres entrevistadas **têm conhecimento muito baixo sobre as medidas preventivas do câncer de colo do útero**

**32%**

- Ensino Fundamental (54%)
- 18-29 anos (47%)
- Classe CD (38%)
- Interior (38%)
- Sem filhos (38%)




**% NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO**  
(Escala de 0 a 10)



Base: 831 casos

B1. Em uma escala de 0 a 10, sendo 0 baixo conhecimento e 10 alto conhecimento, quanto você diria que conhece as medidas de prevenção das seguintes doenças:




---

## IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO



**HÁ UM DESAFIO EVIDENTE DE  
INFORMAR AS MULHERES  
SOBRE O RISCO DO CÂNCER  
DE COLO DO ÚTERO E  
DIVULGAR CAMINHOS DE  
PREVENÇÃO**



# ESTÍMULO APRESENTADO AVALIAMOS INDIVIDUALMENTE A FORÇA DAS INFORMAÇÕES

Todos os dias, cerca de 19 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero.

O câncer de colo do útero é o que mais mata mulheres até os 35 anos de idade.

O câncer de colo do útero é o 2º que mais mata mulheres até os 60 anos de idade.

O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer.


É possível se prevenir com vacinação.

É possível se prevenir com exames de rotina.

É possível se prevenir com tratamento de lesões pré-cancerígenas.

A vacinação é indicada para mulheres e homens de 9 a 45 anos.

Em mulheres, o Papanicolau e outros testes ajudam na detecção precoce de alterações, protegendo sua saúde e qualidade de vida.




## AS 2 INFORMAÇÕES COM MAIOR POTENCIAL DE IMPACTO NA CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO SÃO:

**Todos os dias, cerca de 19 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero.**

**O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer.**

**GRANDE PARTE DAS  
INFORMAÇÕES  
DIVULGADAS É NOVIDADE  
PARA AS MULHERES**




# 82%

**desconheciam** ao menos algumas dessas informações

Todos os dias, cerca de 19 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero é o que mais mata mulheres até os 35 anos de idade e o 2º até os 60 anos de idade. O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer e é possível se prevenir com vacinação, exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas. A vacinação é indicada para mulheres e homens de 9 a 45 anos. Em mulheres, o Papanicolau e outros testes ajudam na detecção precoce de alterações, protegendo sua saúde e qualidade de vida.




## % CONHECIMENTO SOBRE INFORMAÇÕES A RESPEITO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DA VACINA CONTRA HPV



Base: 831 casos

D2. O quanto você acha já tinha conhecimento sobre essas informações a respeito do câncer de colo do útero e da vacina contra HPV? (RU POR LINHA)

**QUANDO BEM INFORMADAS A  
RESPEITO DO CÂNCER DE  
COLO DO ÚTERO E HPV,  
CONSIDERAM MUITO  
IMPORTANTE A REALIZAÇÃO  
DE EXAMES PREVENTIVOS E  
VACINAÇÃO**



Todos os dias, cerca de 19 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero é o que mais mata mulheres até os 35 anos de idade e o 2º até os 60 anos de idade. O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer e é possível se prevenir com vacinação, exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas. A vacinação é indicada para mulheres e homens de 9 a 45 anos. Em mulheres, o Papanicolau e outros testes ajudam na detecção precoce de alterações, protegendo sua saúde e qualidade de vida.

# 89%

das mulheres consideram importante  
**realizar o Papanicolau anualmente.**



% NÍVEL DE IMPORTÂNCIA PARA REALIZAÇÃO ANUAL DO  
**PAPANICOLAU**

(Escala de 0 a 10)



■ 0-4 pouco importante

■ 5-7

■ 8-10 muito importante

Base: 831 casos

D3\_1 Após saber dessas informações, considerando uma escala de 0 a 10, em que 0 significa nada importante e 10 muito importante, o quanto você diria que é importante realizar o PAPANICOLAU anualmente?

Todos os dias, cerca de 19 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero é o que mais mata mulheres até os 35 anos de idade e o 2º até os 60 anos de idade. O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer e é possível se prevenir com vacinação, exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas. A vacinação é indicada para mulheres e homens de 9 a 45 anos. Em mulheres, o Papanicolau e outros testes ajudam na detecção precoce de alterações, protegendo sua saúde e qualidade de vida.

# 91%

das mulheres consideram importante **tomar a vacina de HPV.**



% NÍVEL DE IMPORTÂNCIA PARA TOMAR A VACINA DE HPV  
(Escala de 0 a 10)



■ 0-4 pouco importante


■ 5-7

■ 8-10 muito importante

Base: 831 casos

D4. Após saber dessas informações, considerando uma escala de 0 a 10, em que 0 significa nada importante e 10 muito importante, o quanto você diria que é importante tomar a vacina de HPV?

**NO ENTANTO, MESMO BEM  
INFORMADAS A RESPEITO DO  
CÂNCER DE COLO DO ÚTERO,  
MUITAS AINDA NÃO SE  
IDENTIFICAM COMO PARTE DO  
GRUPO DE RISCO**



# 66%

dessas mulheres concordam que  
podem fazer parte do  
**GRUPO DE RISCO**  
para o câncer de colo do útero

ENQUANTO...

# 34%


Não sabem se são parte do  
grupo de risco ou discordam  
desse afirmação

- Entre quem não se vacinou contra HPV: 32%




### % CONCORDÂNCIA EM FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

(Escala de 1 a 5)



Base: 831 casos

D5. Após saber dessas informações, o quanto você concorda que faz parte de um grupo de risco para o câncer de colo do útero?



POR FIM...



01

## CONHECIMENTO SOBRE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

02

## A VACINA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DO HPV

03

## IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

01. **3 em cada 10 mulheres de 18 a 45 anos têm baixo conhecimento sobre prevenção do câncer de colo do útero**  
Apesar de ser um dos cânceres que mais matam mulheres no Brasil, a falta de informação sobre prevenção ainda é expressiva, sobretudo entre jovens e mulheres com menor escolaridade.
02. **O principal motivo indicado para as mulheres que não se vacinaram contra HPV é a falsa impressão que não têm a idade indicada**  
A vacina é reconhecida como fundamental para a prevenção, mas a cobertura vacinal entre mulheres adultas ainda é baixa, marcada por barreiras práticas e percepções equivocadas sobre idade e necessidade.
03. **8 em cada 10 mulheres desconhecem ao menos uma informação essencial sobre o HPV e o câncer de colo do útero e 3 em cada 10 não concordam que são parte do grupo de risco.**  
A desinformação ainda é um dos principais entraves na prevenção. Quando bem informadas, as mulheres reconhecem a gravidade da doença e a importância da vacinação e dos exames regulares, mas 34% ainda têm dúvidas se são parte do grupo de risco para o câncer.



OBRIGADA!  
OBRIGADO!

---

CONTATO@ILOCOMOTIVA.COM.BR  
(11) 3881-2591 | ILOCOMOTIVA.COM.BR

INSTITUTO  
**LOCO**  
MOTIVA



**TINO**  
COMUNICAÇÃO

Grupo Brasileiro  
de Tumores  
Ginecológicos